

# ПРОФИЛАКТИКА ВПЧ-ИНФЕКЦИИ и РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

## *РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ*

### **ВПЧ-ИНФЕКЦИЯ**

(инфекция, вызываемая вирусом папилломы человека):

- ❖ **НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПЕРЕДАЕТСЯ ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, РЕЖЕ КОНТАКТНО-БЫТОВЫМ.**
- ❖ **ВЫЗЫВАЕТСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ВПЧ-ВИРУСОВ;**
- ❖ **СРЕДИ ВПЧ ВИРУСОВ НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ВЫЗЫВАЮТ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.**
  - **Вирусы 16-го и 18-го типов ВПЧ:**
    - *имеют наиболее высокий онкогенный риск*
      - *являются причиной рака шейки матки у женщин*

Эффективных методов лечения ВПЧ-инфекции не существует.

**НО! СУЩЕСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД  
ПРОФИЛАКТИКИ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ И  
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ:  
ВАКЦИНАЦИЯ!**

❖ **ПРИВИВКИ ПРОТИВ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ ПРОВОДЯТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ 20 ЛЕТ (с 2006 года).**

❖ **ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ ВКЛЮЧЕНА В КАЛЕНДАРИ БОЛЕЕ 160 СТРАН МИРА, в том числе в РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ с 2025 года.**

# **ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПРИВИВОК ПРОТИВ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ**

- ❖ **НЕ СОДЕРЖАТ ЖИЗНЕСПОСОБНОГО  
БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ ВИРУСНОЙ ДНК;**
- ❖ **СОДЕРЖАТ ВИРУСОПОДОБНЫЕ ЧАСТИЦЫ ВПЧ  
ВЫСОКОГО ОНКОГЕННОГО РИСКА**
- ❖ **В СОСТАВ ВАКЦИН НЕ ВХОДЯТ АНТИБИОТИКИ ИЛИ  
КОНСЕРВАНТЫ.**
- ❖ **ВАКЦИНЫ НЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ,  
ДРУГИЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ**
- ❖ **ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ**
- ❖ **В МИРЕ ПРИВИТО БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ  
ЧЕЛОВЕК**
- ❖ **ИСПОЛЬЗОВАНО БОЛЕЕ 270 МИЛЛИОНОВ ДОЗ**

В Республике Беларусь в рамках Национального календаря и перечня по эпидемическим показаниям на безвозмездной основе используется **РЕКОМБИНАНТНАЯ БИВАЛЕНТНАЯ ВАКЦИНА «SECOLIN®» (ЦЕКОЛИН) ПРОИЗВОДСТВА КНР** (изготовлена из очищенных вирусоподобных частиц ВПЧ 16 и 18 типов).

- ❖ **ВАКЦИНА SECOLIN® (ЦЕКОЛИН) ПОКАЗАНА ДЛЯ  
ПРИМЕНЕНИЯ У ДЕВОЧЕК И ЖЕНЩИН С 9-ТИ ДО 45 ЛЕТ.**

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДУПРЕДИТЬ ОПАСНЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ!**